

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS NACIONALES EN NICARAGUA

Flagelo de rápida propagación golpea a todos por igual

Especialistas afirman que la gripe porcina podría propagarse mucho más rápida por el volumen del tráfico aéreo internacional, que las pandemias del siglo XX. Las tres pandemias observadas en el siglo XX -la gripe española en 1918, la gripe asiática en 1957 y la gripe de Hong Kong en 1968 - dieron la vuelta al mundo en un plazo de seis a nueve meses.

Desde 2003 y el brote en Asia de la cepa H5N1 del virus de la gripe aviaria, especialmente violenta, la Organización Mundial de la Salud no cesó de estar pendiente del riesgo de una nueva pandemia, reclamando una mejor preparación tanto a nivel internacional como a nivel de los Estados.

La epidemia de la neumonía atípica (SRAS), que causó más de 800 muertos en el mundo, 350 de los cuales registrados en China, supuso en 2002-2003

una primera alerta, y “familiarizó” al gran público con las máscaras de protección, los controles de temperatura en los aeropuertos y las habitaciones de aislamiento en los hospitales.

De hecho, los Estados empezaron a anunciar medidas de prevención como desaconsejar los viajes a México, aunque la OMS juzgue estas medidas poco eficaces.

Desde la entrada en vigor del Reglamento Sanitario Internacional el año pasado, los Estados tienen que cooperar con la OMS en un plazo de 24 horas en caso de alerta epidémica. Responsable de la coordinación internacional en caso de pandemia (detección del virus, reservas de vacunas, cuarentenas o restricciones de viajes), la OMS se compromete también a brindar ayuda, en especial económica, a los países que lo necesiten.